



## Protocolo de Enfermagem

# Saúde do Homem

**PROTOCOLO DE ENFERMAGEM  
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
NO MUNICÍPIO DE MACAÉ**



**COORDENAÇÃO GERAL  
ENFERMAGEM**



**Macaé**  
PREFEITURA  
Secretaria Executiva | ATENÇÃO BÁSICA

A saúde da população masculina tem sido um problema de grande magnitude no Brasil e no mundo, sendo necessário investimentos tanto pelos gestores quanto na área científica ( PAULA et al, 2002).

A situação epidemiológica da população do sexo masculino é marcada por elevados índices de acidentes, violência e neoplasias. Ainda, determinados comportamentos dessa população são identificados como fatores de risco para o processo de saúde-doença, como o consumo abusivo de bebidas alcóolicas e atitudes violentas no trânsito. (ROCHA, 2021).

Os homens são mais propensos a desenvolver doenças crônicas, além da expectativa de vida ser inferior em comparação com o público feminino. O número de hospitalizações e óbitos por patologias graves e principalmente preveníveis tem aumentado a cada dia. O preconceito, o machismo, a falta de tempo e a incapacidade de se ausentar das suas atividades laborais, são desencadeadores da ausência desse público em se ausentar dos serviços de saúde de atenção primária (JUNIOR, 2021).

A Atenção primária de saúde (APS) pode ser considerada a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) já que possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas, cumprindo papel estratégico na Rede de Atenção à Saúde, servindo como base para o seu ordenamento e efetivação da integralidade da assistência, considerando a singularidade dos sujeitos e sua inserção sociocultural, numa perspectiva de atenção integral à Saúde (BRASIL, 2017). Além de ser um potencializador na integralidade da assistência através do acolhimento e criação de vínculo com a população (STORINO, 2013).

As ações de prevenção objetivam o aumento do acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e fortalecimento do vínculo entre população e equipe de saúde, afirmando a responsabilização dos gestores e dos profissionais pela assistência aos usuários dos serviços de saúde (BRASIL, 2019). Dentre as possibilidades de ações de prevenção, para fins deste plano de pesquisas, destaca-se as ações de atenção à saúde do homem, considerando que esse grupo de usuários apresenta altos percentuais de morbimortalidade, situações de risco específicas e baixa adoção de práticas de cuidado (FERREIRA, 2016).


Diante desse cenário, o estado brasileiro estabeleceu, em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) através da Portaria GM/MS nº 1944, em 27 de agosto.

A PNAISH tem como diretriz a promoção de ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina, nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios (BRASIL, 2009). Destaca-se ainda que a PNAISH foi implementada diante da necessidade urgente de atender a população masculina, visto a baixa procura pelos mesmos aos serviços de promoção e prevenção, e ao mesmo tempo pela necessidade de diminuir altos custos produzidos pelas internações hospitalares (CESARO, 2018). Além da baixa procura dos homens em relação ao cuidado de saúde nas unidades básicas, é visto também que muitos profissionais que trabalham e acolhem essa população desconhecem a PNAISH, precisando melhor ser divulgada e trabalhada nas equipes de saúde. (CARVALHO, 2013)

Este capítulo tem o objetivo de direcionar as ações do enfermeiro voltadas à saúde do homem dentro do contexto da atenção primária, contemplando a consulta de enfermagem: histórico de enfermagem e exame físico, fluxograma de atendimento, os principais diagnósticos e intervenções (farmacológicas e não farmacológicas) de enfermagem correlacionados com o CIAP2 e outras informações relevantes à assistência de enfermagem ao homem, como a realização do pré-natal.

## FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM

O fluxograma apresenta-se como um guia de consulta para nortear o profissional sobre quais condutas tomar frente aos contextos que envolvem a saúde do homem.



## CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO HOMEM

### CONSULTA DE ENFERMAGEM

A Consulta de Enfermagem deve abordar o perfil masculino, aspectos sociodemográficos, condições de saúde, doenças crônicas, comorbidades, fatores de

risco, queixas, enfermidades ou situação de saúde atual e cobertura vacinal. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresentamos como sugestão para registro da atividade, o método SOAP do prontuário eletrônico do cidadão (PEC e-SUS). Recomenda-se utilizar o Instrumento de Consulta de Enfermagem com Adolescente – ESUS/SOAP.

## SUBJETIVO

Motivo da consulta (queixa) e Histórico de Enfermagem

- Identificação: nome, idade, estado civil, crença/religião, profissão, naturalidade, procedência (área de abrangência), escolaridade e Cartão Nacional do SUS/Prontuário.
- Condições de saúde: queixa principal/atual, diagnóstico(s) médico(s) anterior(es), tratamento(s) anterior(es), cirurgia(s) prévia(s) e alergia(s).
- Doenças crônicas, comorbidades e fatores de risco: investigar quanto a doenças crônicas (HAS, DM, AVC, IAM, ICC, IRC, DPOC, Câncer, entre outras) e histórico familiar. Avaliar presença de fatores de risco (obesidade, dislipidemia, tabagismo, etilismo, uso de substâncias ilícitas, entre outros).
- Medicamentos: identificar a utilização de medicamentos em uso contínuo (substância, dose e frequência). Investigar reação adversa/alergia a algum composto medicamentoso.
- Hábitos de Vida: avaliar o cuidado corporal, realização de atividade física, sono/repouso, recreação e lazer, hábitos alimentares, hidratação, atividade sexual e eliminações urinárias e intestinais.

## OBJETIVO

Exame Físico e Resultados de Exames O exame físico deverá ser céfalo-caudal de maneira a analisar qualquer anormalidade, tendo foco em alterações que podem ter sido citadas pelo paciente, segue abaixo sugestão de roteiro que deve ser utilizado conforme histórico de enfermagem.

- Antropometria: peso, altura e IMC, circunferência abdominal (sendo que a medida acima de 94 cm é considerada fator de risco para doenças cardiovasculares, segundo a OMS).
- Sinais Vitais: PA, P, FR, T, SatO2, dor e glicemia capilar.

- Cabeça e pescoço: avaliar crânio, turgência da pele, couro cabeludo – identificar o tipo de alopecia (se houver) ou descamações; olhos, pupila, conjuntiva, ouvido, mucosa nasal, oral e os gânglios do pescoço.

- Tórax: inspeção geral, identificar presença de assimetria, lesões, cicatrizes, edema, eritema, tiragem intercostal, padrão e esforço respiratório. Palpação: Verificar expansão torácica, presença de frêmito vocal e nódulo em mamas. Percussão pulmonar: Averiguar o tipo de som (Claro pulmonar, timpânico, maciço e submaciço). Ausculta Pulmonar: murmúrios vesiculares e ruídos adventícios (roncos, sibilos, estertores/crepitações e estridores). Ausculta Cardíaca: bulhas cardíacas (arritmias, sonoridade, presença de sopros).

- Exame das mamas: realizar a avaliação das mamas, com base na inspeção estática e dinâmica e palpação.

- Abdome: inspeção/palpação: plano, globoso, flácido, distendido, protuberante, normotenso. Presença de incisão, lesão, ferida, hérnia, ostomia. Ausculta: presença de ruídos hidroaéreos, normoativos, hipoativos, hiperativos. Percussão: timpânico, maciço e submaciço. Palpação: investigar nodulações, presença de massas, abaulamentos e dor (local, frequência e intensidade).

- Aparelho geniturinário e seguimento do sistema digestório: investigar presença de mácula, pápula, verruga, escoriações, fissuras, vesículas, edema escrotal, hérnia, cisto ou abscesso. Avaliar eliminação urinária (quantidade, frequência, característica, coloração, jato, presença de dispositivo, incontinência urinária e urgência miccional), região anal (presença de fissuras, sangramentos, hemorroidas e pólipos) e eliminações intestinais (quantidade, frequência, característica, constipação e tenesmo).

- Exame de próstata: a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que os homens acima de 50 anos e os homens acima de 45 anos de pele negra, obesos ou que possuem histórico familiar de câncer de próstata (CaP), devem verificar o valor sérico da dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA) e toque retal, mesmo que não apresentem sintomas específicos (INCA, 2015; SBU, 2016).

O enfermeiro deve solicitar dosagem de PSA Total e Livre e encaminhar para avaliação médica se alterado.

- Sistema Locomotor (Membros superiores e inferiores): identificar presença de lesões, cicatrizes, pulsos (axilar, braquial, radial, femoral, poplíteo, tibial e pedioso), amputações, aspecto das unhas (higienização, formato, presença de micoses e

fungos). Avaliar condições musculares, força muscular (paresia, parestesia e plegia), perfusão periférica e presença de edemas.

- Resultado de Exames: investigar a realização de exames laboratoriais e de imagem.

## AVALIAÇÃO

Elencar os principais diagnósticos CIAP de Enfermagem (vide quadro).

## PLANO

Elencar as principais intervenções de enfermagem: orientações e encaminhamentos, prescrições de medicamentos e solicitação de exames (vide quadro).

## DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

O quadro abaixo apresenta uma sugestão para os principais diagnósticos de enfermagem, tendo como referência a Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) e seguida das principais intervenções de enfermagem. Neste contexto é importante destacar que o Enfermeiro mediante a avaliação, embasado em conhecimento científico, possui autonomia para realização de outros diagnósticos e estabelecer um plano de cuidados, considerando sempre a singularidade do indivíduo, a integralidade do cuidado e recursos que a rede de saúde para atender as necessidades dos usuários. Uma vez que os homens procuram menos os serviços de saúde optou-se, dentre as possíveis intervenções de enfermagem, pela oferta de testes rápidos para IST na maioria dos atendimentos. Enxergamos que se trata de uma oportunidade de investigação de dados objetivos de grande importância para a saúde desta população

## QUADRO 1. DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

| CIAP                                                      | PRINCIPAIS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Orientações e Encaminhamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prescrição Farmacológica | Solicitação de exames                                                                                                                                  |
| (P15) Abuso crônico de álcool (P16) Abuso agudo de álcool | - Discutir estratégias de redução de danos de uso de álcool; - Facilitar acesso ao tratamento; - Encaminhar para serviço de referência; - Orientar quanto ao serviço de AA (Alcoólicos Anônimos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                        | Hemograma Completo; Urina tipo I; Glicemia de jejum; TGO/TGP; Colesterol total e frações; Triglicerídeos; e Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites). |
| - P19 Abuso de drogas                                     | - Encaminhar para o serviço de emergência, se necessário; - Encaminhar para serviço de referência; - Encaminhar para terapia de grupo de apoio; - Facilitar acesso ao tratamento; - Orientar sobre consequências do abuso de drogas e substâncias; - Orientar sobre manejo (controle) dos sintomas de abstinência; - Orientar sobre prevenção de recaída; - Apoiar processo familiar de enfrentamento; - Avaliar adesão ao regime terapêutico; - Promover (proporcionar, fornecer) apoio emocional; - Promover adesão ao regime de exercício físico; - Promover comportamento de busca de saúde; - |                          | Hemograma Completo; Urina tipo I; Glicemia de jejum; Colesterol total e frações; Triglicerídeos; e Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites).          |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Reforçar conquistas; -<br>Discutir estratégias de<br>redução de dano                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |
| (P17) Abuso do tabaco                                                                                                                                                                                                                                   | - Orientar quanto ao<br>Programa Antitabagismo e<br>encaminhar ao mais<br>próximo; - Aconselhar<br>paciente; - Obter dados<br>sobre disposição para<br>abandono de tabagismo; -<br>Orientar sobre exposição<br>ao tabagismo secundário<br>(passivo). |                                                                      | Hemograma Completo, Urina tipo I,<br>Colesterol total e frações, Triglicerídeos e<br>Testes Rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites)        |
| (Y06) Sinais/Sintomas da<br>próstata                                                                                                                                                                                                                    | Encaminhar para consulta<br>médica e/ou serviço de<br>referência.                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Hemograma Completo; Urina tipo I;<br>Colesterol total e frações; Triglicerídeos; e<br>Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites), PSA. |
| (Y04) Sinais/Sintomas<br>do pênis; (Y05)<br>Sinais/Sintomas do<br>escroto/testículo,<br>outros; (Y08)<br>Sinais/Sintomas da<br>função sexual<br>masculina; (Y24) Medo<br>de disfunção sexual<br>masculina, (Y28)<br>Limitação<br>funcional/incapacidade | Encaminhar para consulta<br>médica e/ou serviço de<br>referência.                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Hemograma Completo; Urina tipo I;<br>Colesterol total e frações; Triglicerídeos; e<br>Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites).      |
| (U01) Disúria/Micção<br>dolorosa; Y71 Gonorreia<br>masculina <sup>[1]</sup> <sub>SEP</sub>                                                                                                                                                              | Investigar causas; orientar<br>quanto ao aumento da<br>ingesta de líquidos (água,<br>sucos naturais, entre<br>outros). Encaminhar ao<br>médico para tratar ITU.                                                                                      | Ver protocolo de<br>IST para<br>tratamento de<br>corrimento uretral. | Hemograma completo, Urina tipo I e Testes<br>rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites).                                                      |
| (U08) Retenção urinária<br>(U29) Sinais/sintomas                                                                                                                                                                                                        | investigar causas; fazer<br>rastreamento de câncer;                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | PSA, se indicado.                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aparelho urinário, outros (U04) Incontinência urinária <sup>[1][2][SEP]</sup>                                                                         | Encaminhar para consulta médica.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                          |
| (B04) Sinais/Sintomas do sangue, (B90) Infecção por VIH/ SIDA (Y70) Sífilis masculina <sup>[1][2][SEP]</sup> (D72) Hepatite viral <sup>[1][SEP]</sup> | - Seguir protocolo de IST diante de TR reagente; - Solicitar exames de testagem da(s) parceria(s) sexuais; - Ofertar preservativo masculino e/ou feminino; - Encaminhar para serviço de referência, conforme protocolo municipal.                         | Seguir protocolo de IST.                                                                                    | Hemograma Completo; Urina tipo I; Colesterol total e frações; Triglicerídeos; e Seguir protocolo de IST. |
| Y14 Planejamento familiar, outros <sup>[1][2][SEP]</sup>                                                                                              | - Orientar sobre a importância do uso de métodos contraceptivos; - Orientar sobre prevenção de IST; - Promover apoio emocional; - Realizar atividades educativas sobre prevenção de IST's. - Seguir Protocolo de Profilaxia Pós-Exposição, se necessário. | Encaminhar para prescrição da medicação de Profilaxia Pós Exposição, conforme fluxo municipal, se indicado. | Realizar testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites Virais.                                           |
| Y25 Medo doença transmissão sexual <sup>[1][2][SEP]</sup>                                                                                             | - Orientar sobre a importância do uso de métodos contraceptivos; - Orientar sobre prevenção de IST; - Promover apoio emocional; - Realizar atividades educativas sobre prevenção de IST's. - Seguir Protocolo de Profilaxia Pós-Exposição, se necessário. |                                                                                                             | Realizar testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites Virais                                            |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A03) Febre                                                                                                                                                          | Investigar causa; encaminhar para consulta médica; Aplicar compressa fria.                                                                                                                                                                                                                                          | Dipirona 500mg de 6/6 horas, se necessário.        | Hemograma completo; Urina tipo I (conforme queixa)                                                                                            |
| (Y16) Sinais/Sintomas da mama masculina                                                                                                                              | Encaminhar para consulta médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Hemograma Completo; Urina tipo I; Glicemia de jejum; Colesterol total e frações; Triglicerídeos; e Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites). |
| (T29) Sinais/Sintomas endocrinológicos/metabólicos/nutricionais, outros (T87) Hipoglicemia (T89) Diabetes insulino-dependente (T90) Diabetes não insulino-dependente | - Seguir protocolo de Diabetes; - Orientar hábitos alimentares saudáveis e associados a atividades físicas; - Orientar quanto ao abuso de álcool e tabaco; - Atentar para sinais de complicações; - Encaminhar para o serviço de urgência, se necessário; - Encaminhar para equipe multidisciplinar, se necessário. | Seguir protocolo de Diabetes                       | Seguir protocolo de Diabetes e Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites).                                                                     |
| (K85) Pressão Arterial Elevada (K86) Hipertensão sem complicações (K87) Hipertensão com complicações                                                                 | - Seguir protocolo de Hipertensão Arterial; - Incentivar mudanças de estilo de vida; - Orientar ingestão de dieta hipossódica; - Controlar o excesso de peso; - Monitorar pressão arterial frequentemente; - Reforçar a prática de atividades físicas regulares.                                                    | Seguir protocolo de Hipertensão Arterial.          | Seguir protocolo de Hipertensão Arterial e Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites).                                                         |
| (Y14) Planejamento familiar, outros                                                                                                                                  | Encaminhar para participação da palestra de Planejamento Familiar;                                                                                                                                                                                                                                                  | Seguir protocolo de Planejamento Familiar em Saúde | Hemograma Completo, Urina tipo I, Colesterol total e frações, Triglicerídeos e Testes Rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites).                     |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|                                            | Orientar e oferecer preservativos masculino e/ou feminino; Orientar e oferecer demais métodos contraceptivos disponíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | da Mulher, se necessário. |  |
| (P29) Sinais/Sintomas psicológicos, outros | Realizar escuta qualificada; Apoiar imagem corporal, positiva; Identificar percepções alteradas; Obter dados sobre condição psicológica; Solicitar apoio da equipe multiprofissional, se necessário Encaminhar para o serviço de referência (CAPS, NASF, entre outros); Promover comportamento de busca de saúde                                                                                                                             |                           |  |
| (P77) Suicídio/ tentativa de suicídio      | Se necessário, encaminhar para o serviço de emergência ou consulta e avaliação médica; - Obter dados sobre condição psicológica; - Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; - Gerenciar comportamento negativo; - Identificar percepções alteradas; - Reforçar controle de impulsos; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional, se necessário; - Notificar violência autoprovocada; - Monitorar adesão ao tratamento; - Promover |                           |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | apoio emocional; -<br>Implementar precauções<br>contra o suicídio com<br>orientações aos familiares<br>para vigilância; - Incentivar<br>a participação em grupos<br>terapêuticos.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| (A98) Medicina<br>preventiva/<br>manutenção de saúde.<br>(pré-natal do parceiro) | -Atualizar cartão de vacina,<br>se necessário. -Incentivar a<br>participação nas atividades<br>educativas, nas consultas e<br>exames de pré-natal da<br>parceira. - Orientar a<br>importância da<br>participação no momento<br>do parto, pós-parto e<br>amamentação. - Realizar<br>avaliação antropométrica. -<br>Aferir a pressão arterial. -<br>Esclarecer os direitos da<br>gestante e do parceiro e<br>incentivar a visita do casal à<br>maternidade. |  | Tipagem sanguínea e Fator Rh (no caso de a<br>mulher ser Fator Rh negativo), Hemograma<br>Completo, Glicemia de jejum; Urina tipo I,<br>Colesterol total e frações, Triglicerídeos e<br>Testes Rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites). |
| - A98 Medicina<br>preventiva/manutenção<br>de saúde                              | - Reforço positivo e práticas<br>saudáveis e eficientes; -<br>Promover comportamento<br>de busca de saúde.<br>- Reforço positivo da<br>capacidade de executar o<br>autocuidado.<br>- Orientar plano de<br>cuidado; - Orientar o<br>paciente sobre a<br>importância do<br>autocuidado.                                                                                                                                                                     |  | Hemograma Completo; Urina tipo I;<br>Colesterol total e frações; Glicemia de jejum;<br>Triglicerídeos; e Testes rápidos (HIV, Sífilis e<br>Hepatites), Tgo, Tgp, uréia e creatinina.                                               |

|  |                                                                 |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | - Realizar reforço positivo para manter esquema vacinal em dia. |  |  |
|  |                                                                 |  |  |

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política nacional de atenção básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 92 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil. Diário Oficial da União 2019; 13 nov.

CARVALHO, F.P.B. et al. Conhecimento acerca da política nacional de atenção integral à saúde do homem na estratégia de saúde da família. Rev. APS. 2013.

CESARO, B.C, Santos HB, Silva FNM. Masculinidades inerentes à política brasileira de saúde do homem. Rev Panam de Salud Publica. 2018;42:e119.

COREN-MS. Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde no estado de Mato Grosso do Sul. 1ºed. Campo Grande, MS: Coren MS, 2021.

FERREIRA, S.R. Atuação do enfermeiro na atenção primária de saúde, Rio de Janeiro: ATHENEU, 2017.

ROCHA, J.M. et al. As compreensões da população masculina acerca do cuidado em saúde. Revista Ciência Plural. 2022; 8(2): e26582

STORINO, L.P; SOUZA, K.V; SILVA, K.L. Necessidades de saúde de homens na atenção básica: acolhimento e vínculo como potencializadores da integralidade. Escola Anna Nery Rev. de Enfermagem 17(4): 638-645, 2013.